



表参道メディカルクリニック
OMOTESANDO MEDICAL CLINIC

フラクショナル炭酸ガスレーザーで
治療を受けられる方へ

説明・同意書 (1/2)

フラクショナル炭酸ガスレーザーは、10,600nmの波長を持ち、皮膚の水分に反応し蒸散と熱凝固作用を起こします。この作用は組織の一部を確実に蒸散し組織を取り除き、コラーゲンの収縮を生じさせるので、ニキビ跡や傷跡、毛穴の開き、肌質の改善等の治療として使用されています。

治療を行われた当日から数日は治療部位が赤くなったり、腫れたりすることがあり、数日間は自己ケアが必要となります。また、治療が完了するまでは色素沈着のリスクを減らすために、日焼け止めの使用が必要となります。

適応症例

ニキビ跡(クレーター状の陥凹) | 毛穴の開き・凹凸 | 皮膚のシワ | 瘢痕

禁忌事項

下記項目に該当する方は治療がお受けできません。

- ・アキュテイン(イソトレチノイン)使用中の方
- ・治療部位に重篤な皮膚疾患及び感染症がある方
- ・神経系疾患、心臓疾患の方
- ・ヘルペスウイルスの症状が出ている方
- ・免疫不全症や免疫抑制剤使用中の方
- ・皮膚悪性腫瘍、前癌病変、又はその疑いがある方
- ・治療部位に血管系疾患、刺青、アートメイクを入れている方
- ・妊娠している方
- ・ケロイドを有する部位及びケロイド体質の方
- ・糖尿病重症の方※医師の判断
- ・光過敏症の方
- ・抗凝固異常の方又は抗凝固系薬剤使用中の方
- ・治療部位に化学物質を使用の方
- ・日焼け直後の方

治療概要

病変に適した照射モードで治療を行います。治療直後は赤味や腫れ、表皮がはがれた部分が点状に白っぽくなったりします。しかし、これは望ましい反応ですので心配はいりません。赤味や腫れは治療後数日続きますが自然に改善します。また、照射直後にヒリヒリ感がありますが、一時的なもので時間の経過とともに治まります。

1. 1回の治療でかなりの効果が得られますが、1ヶ月に1回推奨治療回数は5回以上です。また効果には個人差があり、変化が見られにくい場合もあります。
2. ニキビ痕の治療に関しては治療回数が必要となります。
3. 術直後より、赤み、腫脹、熱感が出ますが、通常2日～5日程度で消失します。赤みは、軽めの照射で1～3日程度、強めの照射で1～2週間のダウンタイムは考慮してください。また軽い出血を伴うこともあるので、その場合は軽く圧迫し、止血するようにしてください。

経過・アフターケアについて

- ・治療部位の腫れ、赤み等の症状は冷却することで軽減しやすくなります。
- ・治療後は3日～2週間程度、1日2回(朝・夜)処方された外用薬を塗布してください。
- ・感染を予防するために皮膚は清潔にしてください。赤みや腫れが続いている間はぬるま湯や水で優しく洗い流してください。スクラブ入りの洗顔剤は使用しないでください。
- ・合併症がなければメイクは3-5日後からになります。髭剃りは痂皮が剥がれてから行ってください。
- ・治療当日はシャワー浴のみにし、入浴やサウナはお控えください。また、激しい運動や飲酒もお控えください。
- ・治療期間中は日焼け止め(SPF30以上)を使用し、日焼けを予防してください。



表参道メディカルクリニック
OMOTESANDO MEDICAL CLINIC

フラクショナル炭酸ガスレーザーで
治療を受けられる方へ

説明・同意書 (2/2)

合併症(副作用)について

- ・まれに治療部位に内出血や紫斑、水疱(水ぶくれ)をともなった熱傷が生じる可能性があります。症状が改善しない場合は、ご連絡ください。
- ・色素沈着が数か月程度残存する可能性があります。

担当者氏名 _____ 医師署名: _____

私は、上記の内容を理解した上で、本日治療を受けることに同意いたします。

西暦 年 月 日

氏名: _____ ④

※施術を受ける方が未成年者の場合は親権者・法定代理人様の直筆にて下記をご記入ください。

親権者・法定代理人氏名: _____ ④ (本人との続柄: _____)

親権者・法定代理人住所: _____ 電話番号 _____

